



INSTRUCTION

Recommandations pour la surveillance des traitements anticoagulants

Réf : PM1-PLV-INS-HEM-REC

Page 1 sur 2

Version 02

Emplacement	Logiciel de gestion documentaire Poste de travail	Nombre de copies: 1 papier + 1 numérique
Modifications apportées surlignées en jaune		Date d'application: 04/09/2021

	Rédaction	Validation du contenu	Approbation	Diffusion
NOM :	Amouroux Isabelle	Amouroux Isabelle	Amouroux Isabelle	Desbois Delphine
Fonction :	BR	BR	BR	RAQ
Date :	20/07/2021	20/07/2021	20/07/2021	04/08/2021
Signature :				

RECOMMANDATIONS POUR LA SURVEILLANCE DES TRAITEMENTS

ANTICOAGULANTS à visée CURATIVE

SURVEILLANCE des traitements anticoagulants	Traitement	Que demander ?	Quand
	AVK	INR	Selon molécule utilisée
HBPM	PLAQUETTES	<ul style="list-style-type: none"> Pas de surveillance dans les cas simples 2 fois/semaine (3semaines) puis 1/mois : <ul style="list-style-type: none"> - en post opératoire ou post traumatique - en relais de l'HNF - si ATCD de trait par HBPM dans les 6 derniers mois car risque de TIH ou comorbidité 	
	Ajouter activité anti Xa	3-4h après injection Si : IR, âge extrême de la vie, obésité, maigreur, syndrome inflammatoire, Femme enceinte avant péridurale , Pédiatrie.	
	En cas d'urgence préopératoire on ne tient pas compte de l'heure d'injection		
HNF	TCA	Par défaut surveillance par le TCA : /6h jusqu'à l'équilibre puis 1 fois/24h	
	Activité anti-Xa	Selon les recommandations, pour tout traitement HNF le suivi se fait sur l'activité anti-Xa	
	Plaquettes	2 fois /semaine sauf patient COVID toutes les 48h	

**Recommandations pour la surveillance des traitements anticoagulants****RECOMMANDATIONS POUR LA SURVEILLANCE DES TRAITEMENTS PAR HBPM EN PREVENTIF :**

SURVEILLANCE DES HBPM	PLAQUETTES	2 fois/semaine (3 semaines) puis 1/mois
	Activité anti Xa	Uniquement si grossesse, IR, ou sujet âgé avant passage au bloc opératoire (taux résiduel)

RECOMMANDATIONS POUR LA SURVEILLANCE DES TRAITEMENTS PAR AOD :

TRAITEMENT	QUE DEMANDER	QUAND
DABIGATRAN (Pradaxa*)	Anti-IIa spécifique	Uniquement en cas d'hémorragie, d'IR, sujets âgés, avant intervention chirurgicale, poids extrêmes. De préférence juste avant la prise suivante et en situation d'urgence 2 dosages recommandés (second dosage à la fin de l'intervalle de dose).
RIVAROXABAN (Xarelto*)	Anti-Xa spécifique	
APIXABAN (Eliquis*)	Anti-Xa spécifique	
EDOxabAN (Lixiana*)	Anti-Xa spécifique	